

lector: L. Ávila. 2 de diciembre de 1995.

ZV-UNRC = Zoología Vertebrados-Universidad Nacional de Río Cuarto.

Comentarios

Liolaemus donosobarrosi es un lagarto psammófilo el cual era conocido hasta el momento para dos localidades: médanos salitrosos de Matancilla, dto. Malargüe, prov. Mendoza (localidad tipo, CeI 1974) y Cipolleti, dto. Gral. Roca, prov. Río Negro (CeI 1979, 1986). Con esta nueva cita se extiende su distribución unos 150 km. al oeste y es la primera cita para la provincia de Neuquén.

Literatura citada

- CEI, J.M. 1974. Two new species of *Ctenoblepharis* (Reptilia, Iguanidae) from the arid environments of the central Argentina (Mendoza province). *J. herpetol.* 8: 71-75.
- CEI, J.M. 1979. A reassessment of the genus *Ctenoblepharis* (Reptilia, Sauria, Iguanidae) with a description of a new subspecies of *Liolaemus multimaculatus* from Western Argentina. *J. herpetol.* 13(3): 297-302.
- CEI, J.M. 1986. Reptiles del centro, centro-oeste y sur de la Argentina. Herpetofauna de zonas áridas y semiáridas. Mon. IV. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino, 527 pp.

AMPLIACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE *HYLA SANBORNI* SCHMIDT, 1944 (ANURA: HYLIDAE) PRIMERA CITA PARA LA PROVINCIA DE MISIONES

ROBERTO E. STETSON,
PATRICIA BENÍTEZ Y NELSON PIVIDORI
Proyecto de Relevamiento Herpetológico de la
Facultad de Ciencias Exactas Químicas y
Naturales de la Universidad Nacional de
Misiones. Félix de Azara 174, CP 3300
Posadas, Misiones.

Hyla sanborni SCHMIDT, 1944. Rep. Argentina, provincia de Misiones, Depto capital, Posadas (27° 23' S, 55° 53' W) CH-MUNaM 075 agosto de 1987; 098 y 099 abril de 1988, 246 octubre de 1992, 401 y 402 septiembre de 1995 colector: R. E. Stetson; 428 al 436 marzo de 1996 colector: R. E. Stetson y colaboradores.

Comentarios

El hallazgo de *Hyla sanborni* en la Ciudad de Posadas surge como consecuencia del estudio que se viene realizando desde el año 1986, con el objeto de conocer las especies que hoy comparten los espacios urbanos con el hombre.

Los resultados obtenidos hasta la fecha han permitido confirmar que un número importante de especies se adaptan a las modificaciones introducidas por el hombre. Se ha contribuido a engrosar el número de especies para la provincia de Misiones, *Bufo pygmaeus*, Myers y Carvalho, 1952; *Leptodactylus chaquensis* CeI, 1950; *Hyla raniceps* (Cope, 1862), (Stetson, 1994).

Los ejemplares todos machos, fueron capturados cantando en dos áreas periféricas al centro de la ciudad, una de las cuales es el Balneario Municipal.

La distribución anterior de la especie comprendía las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe (CeI, 1980; Klappenbach y Langone 1992; Langone y Basso 1987 Gallardo, 1987; Gallardo y Olmedo 1992).

Agradecimiento

Dr. Esteban O Lavilla, por la corrección preliminar del manuscrito y sus oportunas sugerencias.

Literatura citada

- CEI, J. M. 1980. Amphibians of Argentina. Mon. Zool. Italiano, 2 : 609 pp..
- GALLARDO, J. M. 1987. Anfibios Argentinos - Guía para su identificación. Libr. Agropecuaria, Bs. As., primera edición: 1- 96.
- GALLARDO, J. M. y OLMEDO, E. U. de. 1992. Anfibios de la República Argentina: ecología y comportamiento. *Fauna de Agua dulce. Amphibia*, Bs. As., 41 (1): 5- 11.
- KLAPPENBACH, M. y LANGONE, J. 1992.

Lista sistemática y sinonímica de los Anfibios del Uruguay. *Anales del Mus. Nat. de Hist. Nat. de Montevideo. Serie 2a*, vol. VIII: 163- 222.

- LANGONE, J. A. y N. G. BASSO, 1987. Distribución geográfica y sinonimia de *Hyla nana* Boulenger, 1889 e *Hyla sanborni*. *Com. Zool. del Mus. de Hist. Nat. de Montevideo. N° 164*, Vol. XI: 1 - 17.
- STETSON, R. E., 1994. Nuevos aportes al conocimiento de anuros urbanos; primera cita de *Bufo pygmaeus* Myers y Carvalho, 1952 (Bufonidae) y *Leptodactylus chaquensis* Cei, 1950 (Leptodactylidae), para Misiones. *Notas Científicas de la Dir. Gral. de Cs. y Tec. de la Prov. de Mnes.*, N° 2: 1 -5.

SOBRE LA PRESENCIA DE PHIMOPHIS GUERINI (DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL) (SERPENTES: COLUBRIDAE) EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GERARDO C. LEYNAUD*
Y MARGARITA CHIARAVIGLIO**

*Centro de Zoología Aplicada
(Fac. Cs. Ex. Fis. y Nat., U.N.C)

**Diversidad Animal II
(Fac. Cs. Ex. Fis. y Nat., U.N.C)

Phimophis guerini (Duméril, Bibron & Duméril) Rep. Argentina, prov. de Córdoba, dpto. Punilla, Parque Siquiman (31° 21' S; 64° 30' W). Marzo de 1995. Colectores: Marcela Blangino, Margarita Chiaraviglio y Gerardo Leynaud. CZA00032 (colección de referencia Centro de Zoología Aplicada, Córdoba, Capital).

La mención de *Phimophis guerini* en la provincia de Córdoba se remonta a princi-

pios de siglo, al ser descrito por Serié (1915) un ejemplar juvenil procedente de la localidad serrana de Alta Gracia. De esta manera, la provincia de Córdoba es incluida en el área de distribución de la especie en algunos listados sucesivos (Serié, 1936, Cei, 1986 y 1993). Este último indica como dudosa la real existencia de *Phimophis guerini* en Córdoba, advirtiendo la necesidad de confirmar su presencia en dicha provincia con la colección de otros ejemplares.

En esta nota se da a conocer el hallazgo de un ejemplar de *Phimophis guerini* en Córdoba, confirmando de este modo a la provincia en el área de distribución de la especie que incluye además a las provincias argentinas de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe y Tucumán (Abdala, 1990, Williams & Francini, 1991, Cei, 1993 y Yanosky *et al.* 1993).

El ejemplar coleccionado es un espécimen juvenil, de coloración dorsal pardo oscuro homogéneo, más claro en el área de contacto con las escamas ventrales. Presenta un notable collar nucal amarillento de 5 escamas de ancho (característico de los individuos juveniles de esta especie). Vientre