

NOVEDADES ZOOGEOGRÁFICAS

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE *BOA CONSTRICTOR OCCIDENTALIS* LINNAEUS, 1758 (SERPENTES: BOIDAE)

JUAN CARLOS ACOSTA;¹ & LUCIANO JAVIER ÁVILA²

1. Departamento de Geofísica y Astronomía e Instituto y Museo de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de San Juan. Av. España 400 (N) (5400), San Juan, Argentina. jcasto@impsat1.com.ar

2. CRILAR-CONICET. Mendoza y Entre Ríos s/n (5301)–Anillaco, La Rioja, Argentina. lavila@crilar.com.ar

Localidad: República Argentina, provincia de San Juan, Depto. Caucete, 3 km al norte de la localidad de Baldes de Leyes (31° 33' S; 67° 07' O).

Material de referencia: Instituto y Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de San Juan: IMCN-UNSJ 455. 1 ejemplar juvenil.

Coleccionista: Luciano Javier Ávila. Marzo de 2000.

Comentarios: La localidad típica para la subespecie son las “provincias de Mendoza y San Juan”, siendo su distribución aparente para San Juan el centro-este de la provincia (Ávila, L.J.; J.C. Acosta y F. Murúa. 1998. Cuad. Herp., 12 (1): 11-29.).

Debido a su tamaño y a su actual estatus de conservación es difícil encontrarla en colecciones herpetológicas, lo que genera incertidumbre e imprecisiones cuando se quiere definir su distribución actual. Es por ello que en esta nota se confirma, con ejemplar de referencia, la presencia de la especie para el sureste de San Juan indicando localidad precisa de captura. En el contexto de las Eco-regiones de Argentina (Burkart, R.; N. O. Bárbaro; R. O. Sánchez y D. A. Gómez. 1999. *Programa Desarrollo Institucional Ambiental y Administración de Parques Nacionales*. Buenos Aires, 42 pp.) su distribución indica la presencia ecotonal de la Eco-región Chaco Seco para el sureste de San Juan.